



















- Structures et intervenants (5')
- Présentation générale du programme (20')
- Résultats globaux chiffrés (30')
- Données et outils disponibles (20')
- Perspectives (5')

Réponses aux questions posées dans le chat entre chaque partie

Supports de présentation et enregistrement du webinaire seront disponibles en ligne sur la page du programme : https://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-actions/etudes/18ECOL01







PRÉSENTATION DE L'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE

- **Établissement public** placé sous la tutelle des deux ministères en charge de l'écologie et des finances
- 6 directions territoriales où trouver une compétence technique locale













4 GRANDES PRIORITÉS



Gérer et partager les ressources en eau

Restaurer les milieux

fonctionnement naturel

aquatiques, leur


et la biodiversité



Garantir le bon état des eaux en réduisant les pollutions de toutes origines et par temps de pluie



Agir pour préserver et restaurer la qualité et les habitats naturels des eaux côtières



- 6 agences de l'eau en France
- Contribuent à définir la politique de l'eau du bassin par le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
- Financent la mise en œuvre de cette politique en subventionnant les projets des acteurs locaux











PRÉSENTATION DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL (CBN) DU BASSIN PARISIEN

- Service scientifique du MNHN
- Agrément ministériel depuis 1998 (création en 1994)

Agréé sur les régions Île-de-France, Centre-Val de Loire, les départements de Champagne-Ardenne (région Grand Est) et de Bourgogne (région Bourgogne-France-Comté).

La délégation Bourgogne rejoindre au 1^{er} janvier 2026 le nouveau CBN Bourgogne-France-Comté.









5 MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Au service de la flore, de la fonge et des habitats naturels

- Réseau de 13 CBN et 4 CB émergents en métropole et outre-mer
- Coordonnés par l'OFB







Développer et améliorer les connaissances



Contribuer à la gestion conservatoire et à la restauration écologique



Gérer et valoriser les données



Conseiller à travers l'expertise scientifique et technique



Informer, sensibiliser et mobiliser









Retour sur 10 ans d'inventaire des macrophytes et des végétations associées du bassin de la Seine

Présentation générale du programme







- Difficultés d'accès au milieu nécessitant un matériel spécifique
- Forte plasticité morphologique, taxons d'identification délicate, groupes difficiles
- Flore et végétation : bons indicateurs de la qualité physico-chimique des milieux aquatiques en raison de leur immobilité
- Au cœur de deux directives européennes (DCE et DHFF)
- Taxons souvent délaissés par les botanistes malgré leur fort intérêt écologique et patrimonial














Programme d'inventaire des macrophytes aquatiques du bassin Seine-Normandie

- Lancé en 2016 pour améliorer la connaissance taxonomique et spatiale de la flore et des végétations aquatiques
- Territoire d'agrément du CBN Bassin parisien croisant celui du bassin Seine-Normandie (soit 56 % de ce dernier)
- 30 bassins versants (=unités hydrographiques) étudiés sur 8 ans (2016-2023)
- Principaux cours d'eau : Seine, Marne, Yonne, Aube, Essonne, Eure, Aisne et Loing










- Inventorier tous les types de masses d'eau (cours d'eau, bras morts, lacs, étangs, mares...)
- Centraliser, compiler et valider les données existantes (IBMR, IBML, BE...)
- Améliorer la connaissance taxonomique et spatiale de la flore et des végétations aquatiques (groupes mal connus, mise à jour des catalogues et statuts).
- Améliorer les outils de bioévaluation des écosystèmes aquatiques et ainsi répondre aux objectifs de la DCE










Des plantes aquatiques qui se divisent en 2 groupes distincts :

- Système végétatif sous l'eau ou à la surface
- Pas de tissus de soutien (port flasque)
- Visible à l'œil nu
- Ne supportant que de faibles exondations










Des espèces de tous les groupes taxonomiques









Quelques plantes vasculaires à « vraies » fleurs

...voire très discrète








Des espèces de tous les groupes taxonomiques





Des hépatiques à feuilles

Des mousses











Des espèces de tous les groupes taxonomiques







Des algues filamenteuses



Des algues encroûtantes









Des espèces de tous les groupes taxonomiques





Quelques fougères De très rares lichens









Des espèces de toutes les formes



Hydrophytes fixés à feuilles flottantes

































































Des convergences morphologiques : cas des feuilles rubanées en cours d'eau

























139 espèces en début de programme

Accommodats et amphibies non ciblés mais inventoriés

> Groupe méconnu : 0,6 % des données flore du territoire d'étude en 2016




28 Algues (dont 26 Characées)


Macrophytes:

154 espèces aquatiques visibles à l'œil nu étudiées

Groupe menacé: 39 % des vasculaires en LRR



© R. DUPRÉ – CBNBP | MNHN



4 Lichens









Des espèces qui colonisent des milieux variés



Fleuves, rivières, ruisseaux, sources











Des espèces qui colonisent des milieux variés



Lacs, étangs, mares, ornières













Potametea pectinati: végétations phanérogamiques enracinées des eaux douces


Lemnetea minoris: végétations bryophanérogamiques libres flottantes

LES VÉGÉTATIONS CIBLÉES

Végétations aquatiques :

88 associations végétales réparties en 5 classes





© S. FILOCHE - CBN Bassin parisien | M




Utricularietea intermedio-minoris: végétations bryophanérogamiques des gouilles de tourbières

Plathypnidio-Fontinalietea antipyreticae: végétations bryo-lichéniques des cours d'eau









Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion = Batrachion + Plathypnidio-Fontinalietea

Lacs eutrophes naturels avec végétation du *Magnopotamion* ou de l'*Hydrocharition* = Lemnetea minoris + Potamion pectinati



4 Habitats de la directive Habitats-Faune-Flore visés

> Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à *Chara spp.* = *Charetea fragilis*

Lacs et mares dystrophes naturels = Utricularietea intermedio-minoris

→ Très peu de végétations non prises en compte













- Outils de suivi de la DCE pour la flore par deux protocoles de bioévaluation normalisés en France : indices biologiques macrophytiques en rivière (IBMR) et en lac (IBML)
- Évaluation de la qualité des masses d'eau via leur degré de trophie noté de 0 à 20

Note IBMR	> 14	12 < X ≤ 14	10 < X ≤ 12	8 < X ≤ 10	≤ 8
Niveau trophique	Très faible	Faible	Moyen	Élevé	Très élevé
Couleur	Bleu	Vert	Jaune	Orange	Rouge

- 208 taxons associés à l'IBMR et 294 à l'IBML avec chacun une cote spécifique et un coefficient de sténoécie
- Écart à la référence (EQR) attendue : ratio sur échelle de 0 à 1 et un regroupement en 5 classes d'état : Très bon / Bon / Moyen / Médiocre / Mauvais











- travail par unité hydrographique (UH) avec des prospections par maille
- cibler des secteurs pauvres en données, à enjeux ou avec des données douteuses
- relevés de non-observation si aucun taxon observé
- Protocole spécifique cours d'eau :
- évaluation du niveau trophique via l'IBMR
- en complément du réseau actuel sur des stations DCE sans relevé IBMR
- couverture homogène du réseau sur le bassin versant et premier état de référence













Retour sur 10 ans d'inventaire des macrophytes et des végétations associées du bassin de la Seine

Résultats chiffrés globaux








Résultats quantitatifs

- x3 du jeu de données avec 83 500 données (1,5 % données flore du territoire)
- ≈ ½ données liées au programme et ¼ récoltées par les agents CBN
- Travail important de centralisation, validation et intégration de données IBMR/IBML de l'AESN (17 %)
- Part non négligeable des observateurs bénévoles (10 % des données contre 4 % avant 2016)










Résultats quantitatifs

- x2,6 pour flore vasculaire mais bien plus élevé pour Characées (x6) et Bryophytes (x16)
- Flore vasculaire encore largement dominante avec ≈ ¾ des données aquatiques (données < 2016 encore majoritaires)
- Bryophytes et Charophytes groupes méconnus avec données majoritaires ≥ 2016
- Effort important de saisie de données bibliographiques










Résultats spatiaux

Népartition des données floristiques aquatiques depuis 2000 par maille 5 x 5 km









Résultats qualitatifs

- Nalidation des données : un peu plus de 2 000 données floristiques (2,6 %) ont pu être corrigées depuis le début du programme
- 2/3 de données redéterminées pour 1/3 de données invalidées suivant la possibilité d'identifier le taxon avec lequel une confusion a pu avoir lieu
- Correction sur les groupes difficiles de la flore vasculaire principalement : callitriches (≈ 250 données), renoncules aquatiques (≈ 300 données), potamots (≈ 100 données) ou encore utriculaires (≈ 50 données)










Résultats qualitatifs

RÉSULTATS FLORISTIQUES

Cas de la Renoncule divariquée (Ranunculus circinatus) en Île-de-France : eaux calmes, eutrophes, profondes, basiques des marges de grands cours d'eau, canaux, annexes alluviales...












Des espèces déjà bien connues : Luronium natans, Utricularia minor, Hottonia palustris, Potamogeton coloratus...

- Nes espèces méconnues : Cinclidotus danubicus, Fissidens fontanus, Oenanthe fluviatilis, Utricularia vulgaris...
- Nes espèces exotiques en progression : Egeria densa, Hydrocotyle ranunculoides, Lemna turionifera, Myriophyllum heterophyllum, Wolffia columbiana ...
- Des espèces (re)découvertes sur le territoire (9) : Zannichellia obtusifolia, Chara connivens, Cinclidotus aquaticus, Nitella confervacea, Scorpidium revolvens
- Des espèces considérées comme disparues sur le territoire : Utricularia intermedia, Zannichellia peltata et deux autres non revues depuis 2016










Cas d'une espèce vasculaire méconnue : *Oenanthe fluviatilis*

- Reconnue en France seulement au début du XX^e siècle
- Connue sur l'Avre depuis 2001, considérée disparue en IDF jusqu'en 2014 et en CA jusqu'en 2018
- Répartition localisée : Avre, Eure, Essonne, Loing, Rognon, Bassée, canal de l'Ourcq
- Tendance actuelle en apparente progression : arrêt des faucardages, amélioration de la qualité de l'eau, restauration des cours d'eau
- À nuancer : peu de données anciennes disponibles. Hausse liée à une meilleure détection?












Cas d'une néophyte en progression : Myriophyllum heterophyllum

- Originaire d'Amérique du Nord
- Identifiée pour la première fois sur le bassin en 2018 sur le canal entre Champagne et Bourgogne (Joinville, 52) mais présente depuis 2013










Cas d'une néophyte en progression : Myriophyllum heterophyllum

- Originaire d'Amérique du Nord
- Identifiée pour la première fois sur le bassin en 2018 sur le canal entre Champagne et Bourgogne (Joinville, 52) mais présente depuis 2013
- Progression très rapide dans les canaux navigables : ~30 cm/semaine (VNF & OFB, 2022)












Cas d'une bryophyte méconnue : Fissidens fontanus

- Espèce des rochers et blocs immergés des bords de cours d'eaux lents, considérée comme patrimoniale au début du programme
- 5 données en base sur le bassin en 2016 contre 363 actuellement (6,6 % de fréquence), dont 55 % issues de données extérieures intégrées
- Liée principalement à des grands cours d'eau eutrophes (Seine, Marne, Eure, Oise, Yerres, Serein...), notamment sur les ouvrages
- Plus considérée comme patrimoniale











Résultats quantitatifs

RÉSULTATS VÉGÉTATIONS

- Multiplication par près de 3 du jeu de données avec actuellement plus de 12 500 données soit 7,2 % des données végétations (+ que la flore)
- 41 % des données depuis 2016
- 27 % spécifiquement récoltées par le programme
- Classe des Potametea très majoritaire (64 %), suivie par les Lemnetea (26 %)
- Données géolocalisées nouvelles pour 27 végétations auparavant non renseignées












Résultats spatiaux

Népartition des données de végétations aquatiques depuis 2000 par maille 5 x 5 km

RÉSULTATS VÉGÉTATIONS










Résultats qualitatifs

RÉSULTATS VÉGÉTATIONS

- Validation des données : essentiellement données CBNBP (moins de biais) mais connaissance moins stabilisée que pour la flore
- Un peu plus de 700 données (6 %) corrigées depuis le début du programme
- 97 % de données redéterminées pour très peu de données invalidées
- Amélioration de la précision de la donnée : 55 % de données produites au moins au niveau de l'association végétale depuis 2016
- Travail encore largement perfectible (typologie à venir)










Alliance du Batrachion fluitantis: Herbier des eaux courantes

Nombre de mailles x 3 depuis 2016 (fréquence de 27,5 %)

Nombreuses lacunes comblées sur le territoire: vallées champenoises et de Centre-Val-de-Loire notamment, mais avec encore des zones à compléter (Yonne aval, Seine supérieure, Aisne amont...)

► Forme appauvrie fréquente : 1/3 de données à l'alliance












Association du *Potamo nodosi-Vallisnerietum spiralis* : Herbier thermophile des eaux calmes des canaux, marges de cours d'eau et plans d'eau alluviaux

Végétation méconnue sans donnée avant 2016

■ 108 mailles pour une fréquence de 4,7 %

Répartition : grandes vallées lentes riches en plans d'eau (Seine, Loing, Marne, Yonne, Serein et Oise)












Résultats quantitatifs

- **167 relevés IBMR** réalisés par le CBN depuis 2016
- 972 relevés IBMR et 362 IBML intégrés issues de 307 stations DCE (période 2005–2021)
- 431 stations DCE en cours d'eau suivies par au moins un IBMR (37 pour les IBML)










Résultats spatiaux

- Note moyenne : 9,48 Niveau trophique élevé
- Min 5 (Mauldre & Vaucouleurs) et Max 15,5 (Marne amont)
- 62,2 % des stations de niveau élevé à très élevé (note ≤ 10)
- 5,3 % des stations de niveau faible à très faible (note > 12) très localisées : Yonne amont et aval, Marne amont, Morins










Résultats qualitatifs

RÉSULTATS DCE

- 4 DT avec un niveau trophique élevé
- **DT** Seine-amont : la seule en niveau trophique moyen (10,07)










Résultats qualitatifs

RÉSULTATS DCE

- 4 DT avec un niveau trophique élevé
- DT Seine-amont · la seule en niveau trophique moyen (10,07)
- UH les mieux préservées : Yonne amont (11,5), Avre (10,7) et Marne amont $(10,4) \rightarrow \text{Têtes de bassin}$ forestières, peu impactées
- UH les plus dégradées (< 8) : 6 UH</p> franciliennes → Forte urbanisation et pression agricole










Analyse de l'écart à la référence (EQR)

RÉSULTATS DCE

- Résultats sensiblement. différents
- No. 80 % des stations dans un état. écologique bon à très bon (38,8 % en très bon)
- 16 % (71 stations) dépassent l'EQR attendu
- Seulement 3,5 % en médiocre à mauvais (surtout IDF)
- Tendance plus basse pour la DT Seine francilienne (0,78 vs 0,88-0,91)



→ Stations de référence (témoins) primordiales et à préserver en priorité








Biais

Incertitudes taxonomiques, dates de passage, variations interopérateur, fluctuation des communautés...

RÉSULTATS DCE

- 2 % d'erreur de détermination dans les données collectées avec une amélioration dans le temps (2,5 % < 2015 contre 1,8 $% \ge 2015$)
- Impact sur les notes IBMR : écart moyen sur un site évalué à ±0,57 avec une fourchette de 0 et 3 points (Wach et al., 2019)
- Mauvaise catégorisation de classe de trophie pour 24 % des relevés (Wach & Chauvin, 2018)
 - → Importance de valider les données et de limiter les relevés aux stations suffisamment riches (au moins 10 taxons)
- Cotes spécifiques des taxons inchangées depuis 2003 : largement réévaluable avec les bases de traits écologiques européennes aujourd'hui disponibles











Retour sur 10 ans d'inventaire des macrophytes et des végétations associées du bassin de la Seine

Données et outils disponibles







- Rapports méthodologique et de synthèse
- Résultats par bassin versant sous forme de fiches synthétiques
- Plans d'action conservatoire pour l'Œnanthe des rivières et la Petite Utriculaire

En libre accès ici : https://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d- actions/etudes/18ECOL01





PRODUCTION DISPONIBLE
















COUCHES THÉMATIQUES

- Carte d'alerte flore & végétations à enjeux
- Carte des plantes exotiques envahissantes
- Carte de bioindication
- Accès sur https://lobelia-cbn.fr/ ou en flux WMS et WFS dans un SIG: https://cartes.lobeliacbn.fr/?map=/var/mapserver/mapfiles/cbnsa/wms /mapfile/cbnbp carte thematique aquatiques.ma
- Descriptions techniques (fichiers de styles, notice et liste des taxons) à télécharger au lien suivant : https://francetransfert.numerique.gouv.fr/downlo ad/download-info-public?enclosure=c4ec3276e438-4721-8059-80a5152d6a15&lang=fr (mot de passe : &QpG^Hj!r5Z5s7)










ATLAS CARTOGRAPHIQUES

4 atlas synthétiques par maille 1x1 en annexe du rapport de synthèse

Basés sur les résultats du programme et les bases européennes de traits écologiques :

- Atlas de la richesse en espèces et en alliances patrimoniales (actualisé par rapport aux fiches UH)
- Atlas de la richesse en espèces invasives (actualisé par rapport aux fiches UH)
- Atlas des secteurs à enjeux trophique (décorrélé de l'IBMR)
- Atlas des secteurs à enjeu de température











Retour sur 10 ans d'inventaire des macrophytes et des végétations associées du bassin de la Seine


Perspectives







- Déployé à partir de 2023 sur les territoires des CBN de Bailleul et de Normandie
- 36 bassins versants étudiés sur 80 (11 en cours)
- Norizon 2031 : 78/80 bassins versants étudiés
- 2 bassins versants orphelins à cheval CBAL
- Typologie et clé de détermination des végétations aquatiques du territoire fin 2028









- Actualisation annuelle des cartes thématiques
- Prise en compte des enjeux dans les schémas d'aménagement (SDAGE, SAGE...) et les politiques publiques (SAP, DHFF, DCE...)
- Formation des acteurs à la reconnaissance des macrophytes
- Mise en place de mesures de conservation et de restauration sur les secteurs à enjeux









MERCI DE VOTRE ATTENTION

CONTACT

CBN du Bassin parisien **Délégation Île-de-France**

61 rue Buffon - CP 53 75005 Paris thierry.fernez@mnhn.fr leslie.ferreira@mnhn.fr cbnbp.mnhn.fr

Données en ligne : <u>lobelia-cbn.fr</u>